



MEDIVAG COMBI

KADEFARM

GEL

Żel dopochwowy z kwasem hialuronowym
i kwasem mlekowym 5 aplikatorów po 5 ml

PROFILAKTYKA I WSPOMAGANIE LECZENIA PRZEWLEKŁYCH I NAWRACAJĄCYCH DOLEGLIWOŚCI INTYMNYCH.

Współdziałanie kwasu mlekowego z kwasem hialuronowym wyjątkowo korzystnie i szybko przyczynia się do odbudowy mikroflory pochwy. Zapewniają normalny poziom kwasowości błony śluzowej pochwy i hamują rozwój szkodliwych bakterii.

DZIAŁANIE:

- Redukuje świąd, pieczenie, uczucie suchości, podrażnienia.
- Zmniejsza nadmierne upławy, nieprzyjemny zapach i/lub kolor upławów.
- Wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i grzybiczych.
- Odtwarza i stabilizuje prawidłową florę bakteryjną nabłonka pochwy.
- Zapobiega nawrotom infekcji.
- Normalizuje poziom kwasowości pochwy (pH).

Wyjątkowy skład

kwas hialuronowy
+ kwas mlekowy

Wygodna forma aplikacji!




NAJCZĘSTSZE DOLEGLIWOŚCI INTYMNE I ICH OBJAWY.

Większość dolegliwości intymnych spowodowana jest zaburzeniem środowiska pochwy. W pochwie, w warunkach prawidłowych, obecna jest ogromna liczba bakterii nazywanych mikroflorą lub środowiskiem pochwy. Odpowiadają one za jej kwasowe środowisko (pH). Zmiana poziomu kwasowości, nawet krótkotrwała, może spowodować zaburzenia w obrębie mikroflory pochwy. Jeżeli bakterie kwasu mlekowego zostaną zdominowane przez szkodliwe inne mikroorganizmy (bakterie lub grzyby), mogą wystąpić różne dolegliwości intymne, a w dalszej konsekwencji stan zapalny.

Bakteryjne zapalenie pochwy: Bakteryjne zapalenie pochwy to stan zaburzenia flory bakteryjnej spowodowany szkodliwymi bakteriami. Można je rozpoznać obserwując zmianę wydzieliny. Wydzielina może być bezbarwna lub zabarwiona, jej ilość może być nadmierna, często o nieprzyjemnym zapachu ryby. Często towarzyszą temu takie dolegliwości jak: świąd, podrażnienie, nadwrażliwość, zaczerwienienie i suchość.

Zakażenia Candida (zakażenia grzybicze): Kandydoza jest infekcją grzybiczą spowodowaną przez drożdżopodobne grzyby, głównie *Candida albicans*. Zakażenie pochwy przez *Candida* objawia się świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem i zwykle białą wydzieliną.



MEDIVAG® Combi Gel

ZAWIERA:

Kwas hialuronowy, posiadający właściwości wiązania wody do błony śluzowej, wykazuje działanie nawilżające i ochronne na śluzówkę pochwy, wspomagając tym samym odbudowę i utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej pochwy.

Dzięki odpowiedniemu nawilżeniu tworzone jest właściwe środowisko do zachodzenia naturalnych procesów regeneracyjnych.

Kwas mlekowy tworzy odpowiednie, kwaśne środowisko pochwy zapewniając jej kwaśny odczyn. Dzięki temu utrzymana jest równowaga mikrobiologiczna, co zapobiega ingerencji bakterii, jak i grzybów chorobotwórczych. Zapewnia tym samym ochronę przed uciążliwym stanem klinicznym jakim jest bakteryjna waginoza (bacterial vaginosis).



MEDIVAG® Combi Gel

STOSOWANY PROFILAKTYCZNIE:

- po leczeniu stanu zapalnego - zastosowany bezpośrednio - zmniejsza znacząco ryzyko nawrotu infekcji,
- podczas każdej antybiotykoterapii - stosowany równolegle - zapobiega wyjąłowieniu mikroflory błon śluzowych,
- w okresie rozrodczym - podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej - działa korzystnie w zaburzeniach wydzielania śluzu przez nabłonek pochwy, powodujących uczucie suchości,
- w okresie menopauzy - zwłaszcza podczas przyjmowania terapii hormonalnej - działa nawilżająco w stanach suchości pochwy.

SPOSÓB UŻYCIA:

MEDIVAG® Combi Gel stosuje się jeden raz dziennie, przed snem lub planowanym współżyciem.

Podczas profilaktyki nawracających infekcji zaleca się stosowanie przez 10 dni, 1 raz na noc, co drugi dzień, a następnie, przez kolejnych 5 tygodni, 2 razy w tygodniu, na noc.

MEDIVAG® Combi Gel dostępny jest w aptekach, bez recepty.



Wyłączny dystrybutor w Polsce: Kadefarm Sp. z o.o.
www.kadefarm-zdrowie.pl

