CHLORIVAG®

KADEFARM

Chlorivag® globulki dopochwowe
10 globulek dopochwowych 2,0 g

Chlorivag® globulki dopochwowe to wyrób medyczny wykazujący działanie zapobiegawcze i lecznicze w infekcjach pochwy o charakterze zapalnym, zakaźnym lub dystroficznym. Z uwagi na swój skład rekomendowane są w przypadku zaczerwienienia, świądu i pieczenia z oznakami mikozy i waginozy. Kwas hialuronowy o właściwościach mukoadhezyjnych wykazuje działanie nawilżające i ochronne na śluzówkę pochwy.

Wskazania:
Chlorivag® globulki dopochwowe zaleca się stosować w następujących przypadkach:
- terapia wspomagająca przed- i pooperacyjna w chirurgii ginekologicznej;
- profilaktyka w nawrotach infekcji śluzówki pochwy o charakterze zapalnym, dystroficznym lub zakaźnym;
- terapia wspomagająca w odbudowie prawidłowego nawilżenia śluzówki pochwy;
- pomocniczo w przypadku świądu, zaczerwienień i podrażnień spowodowanych przez różnego rodzaju infekcje.

Skład:
jedna globulka 2 g zawiera: sól sodową kwasu hialuronowego, witaminę E, bromelainę, dichlorowodorek chlorheksydyny *(konserwant)*, mieszankę trójglicerydów.

Sposób użycia:
1. Przed zastosowaniem globulki dokładnie umyć zewnętrzne narządy rodne.
2. Otworzyć opakowanie. Po umyciu rąk wyjąć jedną globulkę z blistra.
3. Delikatnie i możliwie najgłębiej umieścić globulkę w pochwie.

Chlorivag® globulki dopochwowe można stosować jeden raz dziennie przez 10 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dziennej bez konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia:
Produkt do stosowania dopochwowego. Nie połykać. Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub nietolerancji któregokolwiek ze składników produktu. W przypadku ciąży i karmienia piersią produkt może być stosowany wyłącznie, gdy jest to naprawdę konieczne i pod bezpośrednią kontrolą lekarza. Przed zastosowaniem zasięgnąć porady lekarza i omówić z nim możliwe korzyści i zagrożenia dla danego przypadku. W przypadku planowania lub podejrzenia ciąży przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Nie stosować jednocześnie z środkami antyseptycznymi i detergentami. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i poza zasięgiem ich wzroku. Długotrwałe stosowanie produktu, jak w przypadku wszystkich produktów o działaniu miejscowym, może wywołać nadwrażliwość lub miejscowe podrażnienia. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie używać produktu, jeśli opakowanie w momencie pierwszego otwarcia jest zniszczone lub naruszone.
Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Warunki przechowywania:
przechowywać w temperaturze do 30°C. Chronić przed światłem i źródłami ciepła. Podana data ważności dotyczy produktu nienaruszonego i prawidłowo przechowywanego.

Działania niepożądane:
nie są znane lub spodziewane działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu. Dotychczasowe badania produktu nie wykazały działania uczulającego lub innych skutków ubocznych.

Zawartość opakowania: 10 globulek dopochwowych 2,0 g ℮

Producent: Sakura Italia Srl
Via Mantova, 24
25017 Lonato del Garda (BS), Włochy
www.sakuraitalia.it

Dystrybutor w Polsce:

Kadefarm Sp. z o.o.
Sierosław, ul. Gipsowa 18
62-080 Tarnowo Podgórne
www.kadefarm.pl

REF **CO2500**

CE 0477
Wyrób medyczny



Rev.03-0124 POL